



# Basacote® Plus

## 16-4-10+mikro

100% coatad NPK gödning med kontrollerad frisättning av makro- och mikronäring för plantering och jordinbladning.

### Basacote® Plus

Kontrollerad frisättning av NPK-näring, där varje granulat innehåller samtliga makro- och mikroämne för en jämn och säker frisättning. Frisättning beror på temperatur, substratets fukthalt samt plantans behov av näring. Desto högre temperatur och fuktigare förhållande desto snabbare frisättning. Frisättning är aktiv ända ner till ca 6-8 grader.

Lämplig till plantering av sticklingar, prydnadsväxter och för substratinblandning (rekommenderad lagring av substrat innehållande Basacote® Plus är max 10 dagar). Tack vare en kontrollerad frisättning minimeras näringsläckage. Vattning efter applicering och plantering främjar direkt effekt. Hög frostresistens, även vid större temperaturväxling. Låg salthalt.

Finns i tre långtidsverkande former.

#### Basacote Plus 3M

Upp till 3 månaders effekt, baserat på konstant temperatur av 21 grader.

Rekommenderad giva

2,0-2,5 kg per m<sup>3</sup> vid lägre behov

2,5-3,5 kg per m<sup>3</sup> vid normalt behov

3,0-4,0 kg per m<sup>3</sup> vid högre behov

#### Basacote Plus 6M

Upp till 6 månaders effekt, baserat på konstant temperatur av 21 grader.

Rekommenderad giva

2,0-3,0 kg per m<sup>3</sup> vid lägre behov

3,0-4,0 kg per m<sup>3</sup> vid normalt behov

4,0-5,0 kg per m<sup>3</sup> vid högre behov

Makronäring		Mikronäring	
16 %	Kväve (N) 8,6 % NH <sub>4</sub> kväve 7,4 % N <sub>03</sub> kväve	0,4%	Järn (Fe)
3,5 %	Fosfor (P) 2,4 % vattenlösligt	0,06%	Mangan (Mn)
9,8 %	Kalium (K) vattenlösligt	0,02%	Bor (B)
1,2 %	Magnesium (Mg) 0,8% vattenlösligt	0,05%	Koppar (Cu)
5%	Svavel (S) 4,0 % vattenlösligt	0,015%	Molybden (Mo)
		0,02%	Zink (Zn)

#### Förvaring:

Torr och svalt. Utsätt ej för direkt solljus. Öppnad säck återförsluts ordentligt.

#### Granulat:

Grön 90 % inom 2,5-3,5 mm

Densitet: 1150 ±100 kg/m<sup>2</sup>



### Basacote Plus 9M

Upp till 9 månaders effekt, baserat på konstant temperatur av 21 grader.

Rekommenderad giva

2,0-3,0 kg per m<sup>3</sup> vid lägre behov

3,0-4,0 kg per m<sup>3</sup> vid normalt behov

4,0-6,0 kg per m<sup>3</sup> vid högre behov

### Plantskolekultur

Plantering	Produkt	Kg/m <sup>3</sup> alt. g/l
Vinter-Vår	9M	2-6
Vår-Sommar	6M	2-5

### Buskar

Plantering	Produkt	Kg/m <sup>3</sup> alt. g/l
Vinter-Vår	6M	2-4
Vår-Sommar	9M	2-4
Sensommar-Höst	3M	1-3

### Krukväxter

Plantering	Produkt	Kg/m <sup>3</sup> alt. g/l
Beror på tillväxtcykel och kultur	3M	2-4
	6M	2-5
	9M	2-6

### Vid plantering av prydnadsväxter, allé och liknande

Kultur	g/planta
Buskar	10-50 (höjd 0,3-2,0 m)
Träd	20-250 (stamdiameter 3-30 cm)

Observera att samtliga rekommendationer är generella. Gödsling ska alltid anpassas efter behov beroende på kultur, jordmån samt aktuell närings- och organiskt innehåll i marken/substratet.

Art nr	Benämning	Antal kg/fpn	Antal fpn/pall
807 450	Basacote Plus 3M	25 kg	42 fpn
807 451	Basacote Plus 6M	25 kg	42 fpn
807 452	Basacote Plus 9M	25 kg	42 fpn